INSIDE

muco^{derm}®

Origen: dermis porcina

Composición: colágeno acelular nativo

Tamaño: 15 × 20 mm / 20 × 30 mm /
30 × 40 mm / Ø 10 mm

Grosor: 1.2 - 1.7 mm

Tiempo de integración: de 6-9 meses

Propiedad: matriz completamente
reabsorbible

mucoderm®

Una solución eficaz para el aumento de tejido blando

mucoderm® es una matriz de colágeno porosa, acelular, y completamente reabsorbible para el aumento del tejido blando. mucoderm® apoya la revascularización y la integración del tejido blando. La arquitectura uniforme de las fibras de colágeno y las propiedades biológicas únicas convierten mucoderm® en una alternativa válida a los injertos autólogos de tejido conectivo.

>7 años
de seguimiento clínico

Alta Seguridad

El proceso de purificación multi pasos asegura la remoción de todas las proteínas no colágenas, células, inmunógenos potenciales, así como bacterias y virus. La irradiación gamma además garantiza la esterilidad del producto empaquetado.

Fácil Manejo tras la Hidratación

Tiempo de hidratación óptimo de 10-20 minutos para maximizar la estabilidad biomecánica¹.

mucoderm®: CE aprobado según 93/42/CEE

>130

contribuciones científicas
(05/2023)

Prof. Dr. Dr. h.c. Adrian Kasaj, M.Sc:

Basado en mi experiencia clínica e investigación, encuentro que mucoderm® es una alternativa viable, altamente segura y amigable al paciente, al tejido palatal en procedimientos de recubrimiento radicular. El recubrimiento radicular finalizado y el engrosamiento del tejido se caracteriza por un aspecto natural y estético que satisface las expectativas del paciente.

Matriz 3D homogénea

Molde eficiente para la proliferación de una variedad de células de tejido blando y excelente guía para el crecimiento de vasos sanguíneos²,³.

Estabilidad morfológica y de grosor confiables⁹

Estética mejorada y satisfacción del paciente

La matriz tridimensional de colágeno promueve la revascularización temprana y la integración óptima en el tejido adyacente, asegurando un resultado estético exitoso²,⁴,⁵ con reducción del dolor y malestar del paciente¹¹.

webinars de botiss:

Attila Horváth
Bálint Molnár
Alessandro Rossi
Massimo Froscechi
Adrian Kasaj
Dávid Botond Hangyási
y muchos más...

DEVOLVIÉNDOLE LA SONRISA A SU PACIENTE

>25
estudios en curso
con >30 profesionales clínicos
(04/2018)

Prof. Dr. med. dent., Dr. h.c. mult. Anton Sculean, M.Sc.:

En muchos casos uso mucoderm® como alternativa al injerto de tejido conjuntivo. Dada su alta biocompatibilidad y sus excelentes propiedades mecánicas mucoderm® es perfectamente adecuado para el procedimiento de tunelización. Además, también sirve de soporte ideal para sustancias bioactivas como Emdogain® o otros factores de crecimiento.

Prof. Giovanni Zucchelli, DDS, PhD:

El uso complementario de mucoderm® y Emdogain® en el colgajo de avance coronal permite aumentar el grosor del tejido blando y mejorar la calidad de la unión entre el tejido blando y la raíz. Ambos factores son críticos para la estabilidad a largo plazo del resultado de la cobertura radicular.

Ventajas:

- Reducción de la duración de cirugía⁹,¹⁰,¹¹
- Reducción del sangramiento quirúrgico y posquirúrgico⁹,¹⁰
- Reducción de la morbilidad⁹,¹⁰,¹¹

Éxito clínico
Recubrimiento radicular
hasta el 91%⁶,⁷,¹¹
(Clases I-III de Miller)

Encuentre sugerencias de manejo en la „mucoderm® surgical guide“: www.botiss.com

Alta aceptación del paciente¹¹

Aplicación Clínica

Casos clínicos con mucoderm® en **INDICATION-MATRIX.COM**

Recesiones

Prof. A. Sculean y Dr. R. Cosgarea, Universidad de Berna, Suiza, y Universidad de Marburgo, Alemania

Cubrimiento de recesiones múltiples con la técnica de túnel avanzado coronalmente modificado

18 meses

Aumento del tejido blando

Dr. A. Puisys, Vilna, Lituania

Engrosamiento del tejido blando durante la colocación inmediata de implantes

18 meses

Vestibuloplastia

Prof. P. Windisch y Dr. B. Molnár, Universidad Semmelweis de Budapest, Hungría

Reconstrucción de arco completo de profundidad vestibular insuficiente y falta de tejido queratinizado.

6 meses

Más casos: www.indication-matrix.com

ENTRE EN CONTACTO

mucoderm@botiss.com

1: Kasaj et al. Clin Oral Investig. 2016; 20(6):1303-15.
 2: Pabst et al. Odontology. 2016; 104(1):19-26.
 3: Pabst et al. J Periodontol Res. 2014; 49(3):371-81.
 4: Rothamel et al. Head Face Med 2014; 10: (10).
 5: Stefanini et al. Int J Periodontics Restorative Dent; 40(1):121-128.
 6: Cosgarea R. 2016. Quintessence Int. 47(9):739-47.
 7: Ciešlik-Wegemund. 2016 J Periodontol. 17:1-15.
 8: Papi et al. Int J Oral Maxillofac Surg. 2021; 50(2):258-266.
 9: Konstantinova et al. J of IMAB. 2015; 21(4):964-968.
 10: Kasaj et al. 2014. Quintessence Int. 2016; 47(9).
 11: Vincent-Bugnas et al. J Periodontal Implant Sci. 2020; 51(2):77-87.